



The Pterosaur Database


Pterodactylus kochi

The most common of the fossil pterodactyls, many fine specimens have been found, including juvenile remains. Adults have a wingspan of 50 cm. Lower Tithonian, Lithographic Limestone, Bavaria, Germany.

Type Specimens:

P. kochi: Wagner 1837, SM 404 and BSP AS.XIX.3

P. scolopaciceps: (von Meyer 1859, BSP AS.V.29)



Wagner J. A., **1837**, Beschreibung eines neuentdeckten Ornithocephalus nebst allgemeinen Bemerkungen über die Organisation dieser Gattung. Abh. k. bayer. Akad. Wiss. math.-phys. Kl.2, 163–198 & 1 pl.

von Meyer C. E. H., **1859–1860**, Zur Fauna der Vorwelt. Vierte Abt.: Reptilien aus dem lithographischen Schiefer des Jura in Deutschland und Frankreich. 1. Lieferung pp. 1–84 & pls, 1859 and 2. Lieferung pp. 85–114 & pls, 1860. Frankfurt am Main: H. Keller. pp. 7–90, 141–144 & pls 1–10.

von Meyer C. E. H., **1861**, Pterodactylus spectabilis. Verh. schweiz. Ges. Naturwiss. 45, 71–72.

Wellnhofer P., **1968**, Über Pterodactylus kochi (Wagner 1837). N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 132, 97–126 & pls 8–9.

Pseudonyms

Ornithocephalus kochii (Wagner 1837)
Pterodactylus meyeri (Munster 1842)
Pterodactylus scolopaciceps (Munster 1850)
Ornithocephalus meyeri (Wagner 1851)
Diopecephalus kochi (Seeley 1871)
Ornithocephalus kochi (Lydekker 1888)
Pterodactylus elegans (Broili 1925)
Pterodactylus westmani (Wiman 1925)
Pterodactylus cormoranus (Doderlein 1929)
Pterodactylus elegans (Edinger 1941)